



Guía de Reconstitución — Égida

Cómo preparar y dosificar tus péptidos · 20/06/2026 · biojak.com

CÓMO FUNCIONA

1. Agregá el agua bacteriostática (BAC) despacio, deslizándola por la pared del vial. No agites: girá suave hasta disolver.
2. En una jeringa de insulina U-100, 1 unidad = 0,01 mL. La unidad es el líquido que cargás, no cuántos mg.
3. Menos agua = más concentrado (menos unidades). Más agua = más diluido (más unidades).

AGUA QUE RECOMENDAMOS (suficiente y simplifica las cuentas)

Vial 5 mg → 2 mL · Vial 10 mg → 3 mL · Vial 20 mg → 5 mL

EJEMPLO (GHK-Cu): vial 50 mg + 5 mL (agua recomendada). Para una dosis de 2 mg, cargás 20 unidades.

UNIDADES A CARGAR POR DOSIS				con el agua recomendada
PÉPTIDO	DOSIS	5 mg · 2 mL	10 mg · 3 mL	20 mg · 5 mL
BPC-157	500 mcg	20 u	15 u	12,5 u
KPV	500 mcg	20 u	15 u	12,5 u
TB-500	2 mg	80 u	60 u	50 u

PRESENTACIONES ESPECIALES				agua y unidades específicas
PÉPTIDO	DOSIS	PRESENTACIÓN + AGUA		UNIDADES
GHK-Cu	2 mg	50 mg + 5 mL		20 u
		100 mg + 10 mL		20 u

- Los valores asumen el agua recomendada arriba. Si usás otra cantidad, recalculá en biojak.com.
- 1 unidad (jeringa U-100) = 0,01 mL. Las unidades indican volumen a cargar, no miligramos.
- Reconstituido, el péptido se conserva refrigerado (2–8 °C). Usalo dentro de ~4 semanas.
- Para fines de investigación científica únicamente. No apto para uso humano o animal.