Guía de Reconstitución — Titán

Cómo preparar y dosificar tus péptidos · 20/06/2026 · biojak.com

CÓMO FUNCIONA

1. Agregá el agua bacteriostática (BAC) despacio, deslizándola por la pared del vial. No agites: girá suave hasta disolver.
2. En una jeringa de insulina U-100, 1 unidad = 0,01 mL. La unidad es el líquido que cargás, no cuántos mg.
3. Menos agua = más concentrado (menos unidades). Más agua = más diluido (más unidades).

AGUA QUE RECOMENDAMOS (suficiente y simplifica las cuentas)

Vial 5 mg → 2 mL · Vial 10 mg → 3 mL · Vial 20 mg → 5 mL

EJEMPLO (CJC-1295, vial 5mg): 5 mg + 2 mL = 2,5 mg/mL. Cada unidad = 0,025 mg (25 mcg). Para una dosis de 300 mcg, cargás 12 unidades.

UNIDADES A CARGAR POR DOSIS

con el agua recomendada

PÉPTIDO	DOSIS	5 mg · 2 mL	10 mg · 3 mL	20 mg · 5 mL
CJC-1295	300 mcg	**12 u**	**9 u**	**7,5 u**
Ipamorelin	300 mcg	**12 u**	**9 u**	**7,5 u**

- Los valores asumen el agua recomendada arriba. Si usás otra cantidad, recalculá en biojak.com.
- 1 unidad (jeringa U-100) = 0,01 mL. Las unidades indican volumen a cargar, no miligramos.
- Reconstituido, el péptido se conserva refrigerado (2–8 °C). Usalo dentro de ~4 semanas.
- Para fines de investigación científica únicamente. No apto para uso humano o animal.

biojak.com · hola@biojak.com · WhatsApp +54 9 11 5822-1713